

استفاده از سرم مناسب برای رقیق کردن داروهای وریدی

| ملاحظات | سرم مناسب برای رقیق کردن | نام دارو |
|---|--|----------------|
| - | D5W | Aminophylline |
| - | NS- D5W | Amiodarone |
| ناسازگار با محلولهای قندی و بیکربنات سدیم و فروزماید (تشکیل رسوب) | NS | Amrinone |
| - | NS-D5W | Bretylium |
| - | NS-D5W-رینگر لاکتات - سالین نیم نرمال | Dobutamine |
| - | NS-D5W - دکستروز در سالین - رینگر لاکتات | Dopamine |
| - | NS | Epinephrine |
| - | NS-D5W - رینگر لاکتات - سالین نیم نرمال | Esmolol |
| - | NS | Heparine |
| - | D5W | Lidocaine |
| - | NS-D5W | Milrinone |
| - | NS-D5W- D10W | Nitroglycerine |
| - | D5W | Nitroprusside |
| - | D5W | Noradrenaline |
| - | D5W | Procaineamide |
| - | NS | Phenytoine |

D5W - دکستروز ۵٪ - D10W - دکستروز ۱۰٪ - NS - سالین نرمال

** منابع : - اطلاعات دارویی (pharmacology Martindle)

- بروشورهای دارویی

- راهنمایهای پزشک داروخانه مرکز شهید مدنی (سرکار خانم دکتر حلوی)

واحد آموزش پرستاری

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق شهید مدنی تبریز

زمستان ۱۳۸۷