

	یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء	
---	--	---

پلاویکس (کلویدوگرل)



پروانه بهمن پور
پائیز ۱۴۰۲

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

پلاویکس، اسویکس و زیلت از نام‌های تجاری کلویدوگرل یکی از مهم‌ترین داروهای مهارکننده پلاکت خون هستند که مانع لخته شدن خون درون شریان‌ها می‌شود. قرص پلاویکس ۷۵ میلی گرم است و اغلب برای بیمارانی که در معرض افزایش خطر ابتلا به سکنه های قلبی و مغزی درآینده هستند، تجویز می شود و خطر بروز مجدد سکنه های قلبی و مغزی را کاهش می دهد. همچنین بعد از آنژیوپلاستی برای جلوگیری از ایجاد لخته مجدد تجویز می شود و باعث می شود خون به راحتی در عروق جریان یافته و اکسیژن به راحتی به ارگانهای حیاتی بدن مانند قلب و مغز برسد.

طرز مصرف دارو

- ❖ مقدار مصرف، طول مدت مصرف و دفعات مصرف را طبق دستور پزشک معالج به دقت رعایت کنید.
- ❖ این دارو را می توانید همراه غذا و یا بدون آن مصرف کنید.
- ❖ هر وقت یادتان آمد که دوز را مصرف نکرده اید اگر زمان زیادی نگذشته است آن را بلافاصله مصرف کنید. در غیر این صورت صبر کنید تا زمان مصرف دوز بعدی برسد و مقدار دارو را دو برابر مصرف نکنید.
- ❖ هیچ گاه داروی خود را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ❖ به هیچ عنوان مصرف دارو را تا تمام شدن طول درمان قطع نکرده و زمان مشخصی را در روز به مصرف آن اختصاص دهید.

- ❖ این دارو را می توانید در دمای اتاق در ظرف در بسته و به دور از حرارت و رطوبت و نور مستقیم نگهداری کنید. (۲۵°C - ۲۰°C).
- ❖ بهتر است که از مصرف گریپفروت با پلاویکس خودداری کنید؛ چون ترکیبات خاصی دارد که احتمال بروز عوارض جانبی را در شما افزایش می دهد

چه مدت باید از پلاویکس استفاده کنید؟

داروی پلاویکس را باتوجه به شرایط بیمار و با توجه به دستور پزشک مربوطه مصرف خواهید کرد، و مدت زمان مصرف این دارو حداقل شش ماه تا یک سال پس از تشخیص مشکل قلبی استفاده نمایید. و هرگز بدون اطلاع پزشک اقدام به قطع مصرف دارو ننمایید.

هنگام مصرف دارو چه احتیاط هایی باید انجام دهید؟

- ❖ اگر به این دارو حساسیت آلرژیک دارید.
- ❖ اگر زخم معده دارید.
- ❖ اگر ضایعه شدیدی که سبب خونریزی داخل مغزی بوده، داشته اید.
- ❖ اگر باردار و یا شیرده هستید.
- ❖ اگر بیماری کبدی و کلیوی دارید.
- ❖ گر نیازمند اقدامات دندانپزشکی هستید.
- ❖ اگر نیازمند اقدامات درمانی مانند هرگونه عمل جراحی یا اقدامات تهاجمی از قبیل آندوسکوپی، کلونوسکوپی و ... هستید.

عوارض جانبی احتمالی دارو

- ❖ واکنش حساسیتی مانند خارش، کهیر، ورم دست و صورت، دهان، تنگی نفس
- ❖ دیدن خون در مدفوع و یا مدفوع سیاه رنگ
- ❖ تغییر در مقدار و دفعات و رنگ ادرار (ادرار قرمز یا قهوه ای تیره)
- ❖ کاهش سریع وزن
- ❖ درد شدید معده
- ❖ استفراغ خونی
- ❖ دفع خلط خونی
- ❖ بروز کبودی در نواحی مختلف بدن یه دنبال ضربات
- ❖ خستگی شدید

نکته مهم

- ❖ هیچگاه بدون تجویز پزشک و بدون اطلاع به پزشک اقدام به قطع دارو ننمایید.

منابع

- مجید متقی نژاد- فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ-۱۴۰۰- انتشارات اندیشه رفیع
- علی اسدالهی امین -داروهای ژنریک ایران - ۱۴۰۰- انتشارات اندیشه رفیع

این دارو با چه داروهایی تداخل دارد؟

- ❖ در صورتیکه هریک از دارو های زیر را مصرف می کنید، پیش از شروع پلاویکس، پزشک را در جریان قرار دهید.
- ❖ فلوکسیتین، فلوواکسامین
- ❖ دارویی که برای درمان عفونت قارچی مصرف می شود (فلوکونازول، کتوکونازول)
- ❖ دارو های رقیق کننده خون (وارفاین، تیکلوپیدین)
- ❖ دارو های معده (سایمتیدین، امپرازول)
- ❖ آسپرین یا هرنوع داروی دیگری که برای درد یا آرتريت مصرف می شود مانند دیکلوفناک، ناپروکسن، پیروکسیکام

- ❖ اگر ورزش و یا کارهای سنگین انجام می دهید و یا دچار صدمات جسمی، کوفتگی، بریدگی در هر قسمتی از بدن هستید.
- ❖ اگر هر نوع خونریزی از هر قسمتی از بدن مشاهده کردید و یا خون در مدفوع (مدفوع تیره)، خون در ادرار یا خونریزی بینی مشاهده نموده اید.
- ❖ اگر سابقه بیماری های مغزی داشتید،
- ❖ اگر اعتیاد به الکل دارید.

**برای بررسی روند درمان لازم است حتماً حتماً پزشک
معالج را در جریان قرار دهید تا از اثرات ناخواسته این
دارو پیشگیری بعمل آید.**

