

- در صورت فراموشی یک نوبت مصرف ریواروکسaban، به محض یادآوری، دارو را مصرف نمایید. مگر اینکه نوبت بعدی فرا رسیده باشد. در این صورت نوبت فراموش شده را مصرف ننموده و نوبت های بعدی را طبق روال سابق مصرف نمایید.

- از دو برابر نمودن مقدار مصرف در یک نوبت خودداری کنید.

عوارض

مصرف ریواروکسaban ممکن است منجر به عوارضی مثل کبودی یا خونریزی های کوچک (مانند خون دماغ شدن، خونریزی از خراش ها و بریدگی ها) خونریزی لثه ها، خونریزی مداوم و طولانی بینی، خونریزی بیش از حد در دوره قاعدگی، ادرار تیره یا صورتی، سرفه خونی، استفراغ خونی یا به رنگ قهوه، سردرد شدید، سرگیجه و از هوش رفتن، خستگی مداوم یا بی دلیل، ضعف، مدفوع سیاه و خونی و مشکلات بلعیدن شود.

اگر هر کدام از حالت ها تشدید شد یا بهبود نیافت با پزشک مشورت کنید.

ریواروکسaban یک داروی ضد انعقاد است که با پیشگیری از تشکیل لخته خون، از بروز انسداد عروق و عوارض ناشی از آن جلوگیری می نماید. لخته های خون می توانند در سیاهرگ های ناحیه پا، ریه، مغز یا قلب تشکیل گردند و باعث جلوگیری از خون رسانی مناسب به این نواحی شوند. احتمال بروز این اتفاق در دوران نقاهت پس از جراحی ها یا در شرایطی که فرد ضربان قلب غیر طبیعی داشته باشد، افزایش می یابد.

نحوه مصرف

- ریواروکسaban را دقیقاً طبق تجویز پزشک، به صورت منظم در روز مصرف نمایید. به طور معمول مصرف یک قرص در روز در موارد پیشگیری از تشکیل لخته تجویز می گردد. چنانچه شما تحت درمان جهت برطرف شدن لخته خون تشکیل شده باشید، ممکن است مقدار بیشتری از دارو تجویز گردد و در هفته های بعد، مقدار مصرف دارو به تدریج کاهش یابد و به یک نوبت در روز برسد.

- در صورتی که مقدار مصرف ریواروکسaban ۱۰ میلی گرم یا کمتر باشد، می توانید آن را قبل یا پس از غذا مصرف نمایید. چنانچه در یک نوبت بیشتر از ۱۵ میلی گرم برای شما تجویز گردیده است، می توانید آن را همراه یا پس از غذا مصرف کنید زیرا مصرف این دارو همراه غذا جذب آن را از طریق معده افزایش می دهد.

- سعی کنید دارو را به صورت منظم و در زمان مشخصی از روز مصرف نمایید. این کار از فراموش کردن مصرف دارو جلوگیری می نماید.

	یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء	
---	-----------------------------------	---

ریواروکسaban



ژیلافرڈ - کارشناسی پرستاری

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

موارد احتیاط مصرف

مشکلات کبدی، بیماری‌های کلیوی، مشکلات خونریزی (مانند خونریزی معده یا روده و خونریزی مغزی)، سکت، جراحی یا جراحت شدید، اختلالات خونی (مانند کم‌خونی، هموفیلی و ترومبوسیتوپنی)، افتادن یا آسیب‌های مداوم، برخی از مشکلات چشمی (رتینوپاتی)، برخی از مشکلات آنزیمی ارثی (مانند عدم تحمل گالاکتوز، کمبود آنزیم لاکتاس، مشکل هضم گلوکز و گالاکتوز).

منع مصرف

حساسیت شدید به دارو یا سایر ترکیبات فرمولاسیون، - خونریزی فعال ناشی از بیماری

تداخلات دارویی

مصرف این دارو همراه با آسپرین می‌تواند خطر خونریزی را افزایش دهد. با این حال اگر پزشک برای شما دوز پایین آسپرین (۸۱ الی ۳۲۶ میلی‌گرم در روز) را جهت جلوگیری از حمله قلبی تجویز کرده است، مصرف آسپرین را تا جایی که پزشک دستور می‌دهد ادامه دهید.

این دارو با داروهای زیر نیز می‌تواند تداخل داشته باشد:

• فلوکستین، ونلافاکسین

• کوبیسیستات و کنیوآپتان

• داروهای ضد قارچ های آزول مانند ایتراکونازول، کتوکنازول و پساکونازول

• داروهای ایدز مانند آتازاناویر، ریتوناویر و ساکوناویر

• ریفامپین

• عصاره‌ی گل راعی

• داروهای ضد تشنج مانند فنی توئین، فنوباربیتال و کاربامازپین

• کوبیسیستات و کنیوآپتان

• ضد قارچ های آزول مانند ایتراکونازول، کتوکنازول و پساکونازول

• ریفامیسین‌ها مانند ریفامپین

• مهارکننده‌های آنزیم پروتیز ایدز مانند آتازاناویر، ریتوناویر و ساکوناویر

• داروهای ضد تشنج مانند فنی توئین، فنوباربیتال و کاربامازپین

• میفپریستون

شرایط نگهداری

۱. دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

۲. دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.

۳. از مصرف و نگهداری داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

منابع

- مجید متقی نژاد- فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ-

۱۴۰۰- انتشارات اندیشه رفیع

- علی اسدالهی امین -داروهای ژنریک ایران - ۱۴۰۰-

انتشارات اندیشه رفیع