

مقدمه:

سرطان کبد عبارت است از یک تومور بدخیم (سرطانی) که از بافت کبد منشا می گیرد. البته سرطان های کبدی نیز یافت می شوند که از نقاط دیگر منشاء گرفته به کبد گسترش یافته اند. سرطان کبد معمولاً در ارتباط با یک بیماری زمینه ای در کبد مثل سیروز کبد رخ میدهد. این سرطان در دو جنس بوجود می آید ، اما در مردان شایع تر است.

علل:

• سیروز

• هپاتیت B و C

• مواجهه مستقیم با مواد سمی و شیمیایی

• سیگار کشیدن

• مشروبات الکلی

• متاستاز از نواحی دیگر


تظاهرات بالینی:

- تهوع و استفراغ
- کاهش وزن بدن بدون دلیل
- کاهش اشتها
- درد بالای شکم
- ضعف عمومی و خستگی
- ورم شکم
- تغییر رنگ پوست
- زرد شدن چشم ها
- تغییر رنگ مدفوع به سفید

یا من اسممه
دواء و ذکره
شفاء



سرطان کبد



شعله صداقت – کارشناس پرستاری

تابستان ۱۴۰۲

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

یافته های تشخیصی :

- علایم بالینی
- معاینات جسمی
- نتایج آزمایشگاهی
- رادیوگرافیک
- توموگرافی
- اسکن کبد
- سی تی اسکن
- ام ار آی
- لاپاراسکوپی
- بیوپسی

تدابیر طبی:

درمان سرطان کبد (سرطان اولیه کبد) به سطح بیماری و همچنین سن ، سلامت کلی و اولویت های فردی بستگی دارد. روش های درمانی مخصوص سرطان اولیه کبد از قرار زیر هستند.

- جراحی (برداشتن قسمتی از کبد)

- جراحی پیوند کبد

- منجمد کردن سلول های سرطانی

- گرم کردن سلول های سرطانی

- تزریق الکل به تومور

- پرتودرمانی

- دارودرمانی هدفمند

- شیمی درمانی

متاستاز کبدی:

بیشتر متاستازهای کبدی از کولون شروع شده و به کبد سرایت می کند . در واقع سرطان کولورکتال اغلب به سرطان کبدی منجر میشود . از علایم آن میتوان به مواردی چون بی اشتها ، تب، زردی و تهوع اشاره کرد . انجام عمل جراحی به منظور از میان برداشتن تومورهای کبد (اغلب با شیمی درمانی همراه است). از موثرترین روش های درمانی برای بیماران مبتلا به متاستاز کبدی ناشی از سرطان کولورکتال می باشد.

منابع

۱- پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث - انتشارات

جامعه نگر - ۲۰۲۲

۲- اصول و مبانی پرستاری پاتر و پری - انتشارات جامعه

نگر - ۱۴۰۱