

احتیاطات

قبل از دریافت دارو ، انجام آزمایشات خونی برای کنترل مناسب بودن گلبول های خونی و عملکرد طبیعی کبد الزامی است . ممکن است برای ایجاد آمادگی بهتر و کاهش اثرات ناخواسته دارویی (بصورت واکنش های حساسیتی و احتباس مایعات "تورم دست و پا و یا افزایش وزن")، کورتیکو استروئید خوراکی از قبیل دگزامتازون را قبل از تجویز دارو یک عدد در روز و بعد از شروع درمان نیز بمدت ۱-۲ روز دیگر دریافت نماید . در طی درمان ، داروهایی برای رساندن سلول های خونی به حد طبیعی تجویز می گردد .

تداخل دارویی

توصیه می شود قبل از مشورت با پزشک ، از هیچ دارویی استفاده نگردد . زیرا ممکن است تداخلات دارویی بین تاکسوتر و سایر داروها انجام گیرد . هرگونه مصرف دارو را با پزشک درمیان بگذارید .

بارداری و شیردهی

در صورت بارداری و یا تمایل به بارداری ، نباید این دارو تجویز گردد . بایستی در طی درمان از این روش های مناسب پیشگیری از بارداری استفاده گردیده و نیز تا ۳ ماه بعد از دریافت تاکسوتر بایستی از بارداری خودداری گردد . در صورت بروز حاملگی ، بلافاصله به پزشک اطلاع دهید . در دوران شیردهی نیز نبایستی از این دارو استفاده گردد .

تاکسوتر چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد ؟

نام دیگر این دارو که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد Dicetaxel می باشد . این دارو جزء گروهی از داروهای ضد سرطان تحت عنوان taxoids می باشد. هر بسته این دارو حاوی یک ویال تاکسوتر و یک ویال حلال دارو می باشد . تاکسوتر ۲۰ و ۸۰ میلی گرمی بوده و بایستی تغلیظ و رقیق سازی دارو ، قبل از تزریق انجام گیرد .

این دارو توسط پزشک معالج برای سرطان پستان ، اشکال خاص سرطان ریه ، سرطان تخمدان یا سرطان پروستات تجویز می گردد .

قبل از استفاده از تاکسوتر باید چه چیزهایی را در نظر گرفت ؟

در موارد زیر نبایستی از این دارو استفاده گردد :

- سابقه واکنش های آلرژیک شدید به این دارو
- کاهش شدید تعداد گلبول های سفید خون
- وجود بیماری شدید کبدی
- بارداری و دوران شیردهی

	یا من اسمم دواء و ذکره شفاء	
---	--	---

آنچه باید در مورد تاکسوتر بدانید



شعله صداقت - کارشناس پرستاری تابستان ۱۴۰۲

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

اثرات احتمالی دارو در هنگام رانندگی و کارهای عملی

در صورت عدم احساس گیجی، هیچ دلیل خاصی برای عدم انجام این اعمال وجود ندارد.

تاکسوتر چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

- دوز معمولی: دوز مورد استفاده به وزن و وضعیت عمومی بدن بستگی دارد، پزشک بر اساس سطح بدن، دوز مورد نیاز را محاسبه می کند.

- روش تجویز: تاکسوتر از طریق تزریق وریدی تجویز می گردد. تزریق دارو در بیمارستان صورت گرفته و تقریباً یک ساعت طول می کشد.

- دفعات تکرار تزریق دارو: معمولاً دارو هر سه هفته یک بار تزریق می گردد. ممکن است پزشک دوز و دفعات دریافت دارو را بر اساس نتایج آزمایشات خونی و وضعیت عمومی بدن پاسخ شما به دارو، تغییر دهد. در صورت وجود هرگونه سوال، آن را با پزشک و یا با پرستار در میان بگذارید.

عوارض جانبی

تاکسوتر همانند سایر داروهای ضد سرطان، عوارض جانبی ناخواسته ای دارد. در مورد خطرات و فواید درمان، از پزشک سوال کنید

ممکن است در طی تزریق دارو موارد زیر رخ دهد:

- واکنش های آلرژیک که بصورت بروز یک و یا چند تا از علائم زیر مشخص می شود:

(۴)

برافروختگی صورت، واکنش های پوستی، خارش، احساس فشار در قفسه سینه، دردپشت، ناراحتی تنفسی، تب یا لرز.

- در بین فواصل زمانی تزریق تاکسوتر ممکن است موارد زیر رخ دهند:

- کاهش در تعداد گلبول های قرمز یا سفیدخون (گلبول های سفید در مقابله با عفونت نقش خیلی مهمی دارند)، پلاکت ها و افزایش آنزیم های کبدی (بنابراین آزمایشات خونی بایستی بصورت منظم انجام گیرد).

- عفونت های راجعه شدید

- بروز تب، در صورت افزایش درجه حرارت بدن بلافاصله به پزشک مراجعه گردد.

- تورم مکرر دست ها و پاها و یا افزایش وزن بدن

- احساس بی حسی، فرورفتن سوزن و یا درد در مفاصل یا عضلات،

- ناراحتی های شدید معده مانند تهوع و استفراغ، زخم های دهانی و

بی اشتهایی

- یبوست

- برافروختگی صورت، واکنش های پوستی، خارش، احساس درد پشت،

ناراحتی تنفسی

- ریزش مو که شایع است بعد از اتمام درمان، موها مجدداً رشد خواهد

کرد.

- کاهش فشارخون و افزایش ضربان قلب

(۵)

تب یا اسهال بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. در صورت بروز سایر نشانه های بیماری، آنها را با پزشک مطرح نمایید.

نحوه نگهداری تاکسوتر

- تاریخ انقضاء: نباید بعد از تاریخ مصرف دارو مورد استفاده قرار گیرد.

- احتیاطات خاص نگهداری: دارو دور از دسترس کودکان قرارگیرد و یال های تاکسوتر در دمای بین ۲-۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شده و از نور آفتاب محافظت گردند. بایستی تاکسوتر مخلوط شده با حلال، بلافاصله بعد از آماده سازی مورد استفاده قرارگیرد. درعین حال مطرح شده است که پایداری فیزیکی و شیمیایی محلول در دمای اتاق و یا دمای یخچال (۸-۲ درجه سانتیگراد) حفظ شود. محلول آماده شده برای تزریق بایستی در دمای اتاق و در عرض ۴ ساعت تزریق گردد.

منابع

۱- مجید متقی نژاد- فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ-۱۴۰۰-

انتشارات اندیشه رفیع

۲- علی اسدالهی امین -داروهای ژنریک ایران - ۱۴۰۰- انتشارات

اندیشه رفیع

(۶)