

❖ این دارو را می‌توانید در دمای اتاق در ظرف در بسته و به دور از حرارت و رطوبت و نور مستقیم نگهداری کنید. (۲۵<sup>0</sup>C-۲۰<sup>0</sup>C).



### چه مدت باید از پلاویکس استفاده کنید؟

داروی پلاویکس را باتوجه به شرایط بیمار و با توجه به دستور پزشک مربوطه مصرف خواهید کرد، و مدت زمان مصرف این دارو حداقل یک ماه تا یک سال پس از تشخیص مشکل قلبی استفاده نمایید. و هرگز بدون اطلاع پزشک اقدام به قطع مصرف دارو ننمایید.

### هنگام مصرف دارو چه احتیاط‌هایی انجام دهید؟

- ❖ اگر به این دارو حساسیت آلرژیک دارید.
- ❖ اگر زخم معده دارید.
- ❖ اگر ضایعه شدیدی که سبب خونریزی داخل مغزی بوده، داشته‌اید.
- ❖ اگر باردار و یا شیرده هستید.
- ❖ اگر بیماری کبدی و کلیوی دارید.

نام اصلی دارو کلوییدوگرل است که بیشتر با نام پلاویکس شناخته شده است. قرص پلاویکس ۷۵ میلی‌گرم است و یا داروی ضد پلاکتی (رقیق‌کننده خون) است و اغلب برای بیمارانی که در معرض افزایش خطر ابتلا به سکنه‌های قلبی و مغزی در آینده هستند، تجویز می‌شود و خطر بروز مجدد سکنه‌های قلبی و مغزی را کاهش می‌دهد. همچنین بعد از آنژیوپلاستی برای جلوگیری از ایجاد لخته مجدد تجویز می‌شود و باعث می‌شود خون به راحتی در عروق جریان یافته و اکسیژن به راحتی به ارگانهای حیاتی بدن مانند قلب و مغز برسد.

### پلاویکس را چگونه مصرف کنیم؟

- ❖ مقدار مصرف، طول مدت مصرف و دفعات مصرف را طبق دستور پزشک معالج به دقت رعایت کنید.
- ❖ این دارو را می‌توانید همراه غذا و یا بدون آن مصرف کنید.
- ❖ هر وقت یادتان آمد که دوز را مصرف نکرده‌اید اگر زمان زیادی نگذشته است آن را بلافاصله مصرف کنید. در غیر این صورت صبر کنید تا زمان مصرف دوز بعدی برسد و مقدار دارو را دو برابر مصرف نکنید.
- ❖ هیچ‌گاه داروی خود را در دسترس کودکان قرار ندهید.

	<p>یا من اسمه دواء و ذکره شفاء</p>	
--	--------------------------------------------	--

## پلاویکس (کلوییدوگرل)



واحد آموزشی سلامت

پائیز ۹۹

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

## عوارض جانبی احتمالی هنگام مصرف


- ❖ واکنش حساسیتی مانند خارش، کهیر، ورم دست و صورت، دهان، تنگی نفس
- ❖ دیدن خون در مدفوع و یا مدفوع سیاه رنگ
- ❖ تغییر در مقدار و دفعات و رنگ ادرار (ادرار قرمز یا قهوه ای تیره)
- ❖ کاهش سریع وزن
- ❖ درد شدید معده
- ❖ استفراغ خونی
- ❖ دفع خلط خونی



### نکته مهم

- ❖ هیچگاه بدون تجویز پزشک و بدون اطلاع به پزشک اقدام به قطع دارو ننمایید.

(۶)




## این دارو با چه داروهایی تداخل دارد؟

- ❖ در صورتیکه هریک از دارو های زیر را مصرف می کنید، پیش از شروع پلاویکس، پزشک را در جریان قرار دهید.
- ❖ فلوکسیتین، فلوواکسامین
- ❖ دارویی که برای درمان عفونت قارچی مصرف می شود (فلوکونازول، کتوکونازول)
- ❖ دارو های رقیق کننده خون (وارفاین، تیکلوپیدین)
- ❖ دارو های معده (سایمتیدین، امپرازول)
- ❖ آسپرین یا هر نوع داروی دیگری که برای درد یا آرتریت مصرف می شود مانند دیکلوفناک، ناپروکسن، پیروکسیکام

(۵)

- ❖ اگر نیازمند اقدامات دندانپزشکی هستید.
- ❖ اگر نیازمند اقدامات درمانی مانند هرگونه عمل جراحی یا اقدامات تهاجمی از قبیل آندوسکوپی، کلونوسکوپی و ... هستید.
- ❖ اگر ورزش و یا کارهای سنگین انجام می دهید و یا دچار صدمات جسمی، کوفتگی، بریدگی در هر قسمتی از بدن هستید.
- ❖ اگر هر نوع خونریزی از هر قسمتی از بدن مشاهده کردید و یا خون در مدفوع (مدفوع تیره)، خون در ادرار یا خونریزی بینی مشاهده نموده اید.
- ❖ اگر سابقه بیماری های مغزی داشتید، برای بررسی روند درمان لازم است حتماً حتماً پزشک معالج را در جریان قرار دهید تا از اثرات ناخواسته این دارو پیشگیری بعمل آید.



(۴)