

آمادگی های مربوط به رادیوگرافی ، سونوگرافی و سایر تستهای تشخیصی

ردیف	نام تست	آمادگی لازم
۱	رادیوگرافی ساده شکم ، فقرات کمری ، KUB ، IVP ، کلیه و مجاری ادراری و مثانه	قرص بیزاکودیل ۲ عدد ، ۸-۱۲ ساعت قبل از انجام قرص پانکراتین ۶ عدد ، ۸-۱۲ ساعت قبل از انجام
۲	رادیوگرافی معده و اثنی عشر	بیمار حداقل ۶ ساعت قبل از انجام رادیولوژی ناشتا باشد
۳	سونوگرافی کلیه ها ، مجاری ادراری و مثانه	۱- شام ساده ساعت ۷ شب (ترجیحا "یک بشقاب سوپ) بعد از شام ، شربت سناگراف یا روغن کرچک میل شود (۳-۴ قاشق غذا خوری) . ۲- بعد از مصرف شربت ، هر ساعت ۲ عدد قرص دایمتیکون جویده شود (کلا" ۱۰ عدد قرص دایمتیکون) . ۳- مایعات آب و چایی باشد . ۴- تا صبح ناشتا مانده و با مثانه پر جهت سونوگرافی مراجعه شود .
۴	سونوگرافی کبد ، کیسه صفرا و مجاری صفراوی	۱- شام ساده ساعت ۷ شب (ترجیحا "یک بشقاب سوپ) بعد از شام ، شربت سناگراف یا روغن کرچک میل شود (۳-۴ قاشق غذا خوری) . ۲- بعد از مصرف شربت ، هر ساعت ۲ عدد قرص دایمتیکون جویده شود (کلا" ۱۰ عدد قرص دایمتیکون) . ۳- مایعات آب و چایی باشد . ۴- ناشتا به مدت ۱۰-۱۲ ساعت تا انجام سونوگرافی .
۵	کالرداپلر شرایین کلیه ها	۱- شام ساده ساعت ۷ شب (ترجیحا "یک بشقاب سوپ) بعد از شام ، شربت سناگراف یا روغن کرچک میل شود (۳-۴ قاشق غذا خوری) . ۲- بعد از مصرف شربت ، هر ساعت ۲ عدد قرص دایمتیکون جویده شود (کلا" ۱۰ عدد قرص دایمتیکون) . ۳- مایعات آب و چایی باشد . ۴- تا صبح ناشتا مانده و با مثانه پر جهت سونوگرافی مراجعه شود .
۶	سونوگرافی کلیه پیوندی	شام یک بشقاب سوپ معمولی میل شود و ناشتا تا انجام سونوگرافی .
۷	سونوگرافی مثانه – رحم و ضمایم	فقط باید مثانه بیمار پر باشد .
۸	MRI	آمادگی خاصی لازم نیست . در مورد بیماران بی قرار ، قبلا" با واحد رادیولوژی هماهنگی صورت گیرد .
۹	سی تی آنژیوگرافی قلب	Rate=60-70 باشد .
۱۰	سی تی اسکن شکم و لگن	آمادگی خاصی لازم نیست . در سی تی اسکن های همراه با کنتراست خوراکی یا وریدی ، قبلا" با بخش سی تی آنژیوگرافی هماهنگی شود .

تهیه و بازبینی : اردشیر بهروزی (مسئول واحد تصویر برداری)