

ارزیابی سطح هوشیاری بزرگسالان ، مقیاس کمای گلاسکو (GCS)

پاسخ حرکتی (Motor Response)	پاسخ کلامی (Verbal) (Response)	پاسخ چشمی (Eye Response)
اجرا کردن دستورات (۶)	آگاهی داشتن به زمان، مکان و افراد (۵)	باز و بسته کردن خود به خودی چشم ها (۴)
مشخص کردن محل درد (۵)	بیمار گیج بوده، صحبت می کند ولی به زمان، مکان و اشخاص آگاهی ندارد (۴)	باز کردن چشم ها به هنگام صحبت کردن با بیمار یا نسبت به صدای بلند (۳)
دور کردن خود از تحریکات دردناک (۴)	به کاربردن کلمات نامناسب (۳)	باز کردن چشم ها با تحریک دردناک (۲)
دکور تیکه – فلکسیون در اندام فوقانی و اکستانسیون در اندام تحتانی (۳)	به کاربردن کلمات یا صداهای نامفهوم (۲)	بدون پاسخ یا عدم واکنش (۱)
دسر بره – اکستانسیون در اندام فوقانی و تحتانی (۲)	بدون پاسخ کلامی (۱)	
عدم پاسخ به تحریکات دردناک (۱)		

- براساس مقیاس کمای گلاسکو، کمترین نمره برابر ۳ و بیشترین آن ۱۵ است.
- نمره ۵ تا ۷ کمای سبک (Light Coma) و نمرات ۳ و ۴ کمای عمیق (Deep Coma) می باشد.

Reference: Critical Care Nursing 2017

تهیه و تنظیم: بهرام قادری - واحد آموزش پرستاری - مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز - بازبینی: تابستان ۱۳۹۶