

احتیاطات

قبل از دریافت دارو ، انجام آزمایشات خونی برای کنترل مناسب بودن گلبول های خونی و عملکرد طبیعی کبد الزامی است . ممکن است برای ایجاد آمادگی بهتر و کاهش اثرات ناخواسته دارویی (بصورت واکنش های حساسیتی و احتباس مایعات "نورم دست و پا و یا افزایش وزن")، کورتیکو استروئید خوراکی از قبیل دگزامتازون را قبل از تجویز دارو یک عدد در روز و بعد از شروع درمان نیز بمدت ۲-۱ روز دیگر دریافت نماید . در طی درمان ، داروهایی برای رساندن سلول های خونی به حد طبیعی تجویز می گردد .

تداخل دارویی

توصیه می شود قبل از مشورت با پزشک ، از هیچ دارویی استفاده نگردد . زیرا ممکن است تداخلات دارویی بین تاکسوتر و سایر داروها انجام گیرد . هرگونه مصرف دارو را با پزشک درمیان بگذارید .

بارداری و شیردهی

در صورت بارداری و یا تمایل به بارداری ، نباید این دارو تجویز گردد . بایستی در طی درمان از این روش های مناسب پیشگیری از بارداری استفاده گردیده و نیز تا ۳ماه بعد از دریافت تاکسوتر بایستی از بارداری خودداری گردد . در صورت بروز حاملگی ، بلافاصله به پزشک اطلاع دهید . در دوران شیردهی نیز نبایستی از این دارو استفاده گردد .

تاکسوتر چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟



نام دیگر این دارو که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد Dicetaxel می باشد . این دارو جزء گروهی از داروهای ضد سرطان تحت عنوان taxoids می باشد. هر بسته این دارو حاوی یک ویال تاکسوتر و یک ویال حلال دارو می باشد . تاکسوتر ۲۰ و ۸۰ میلی گرمی بوده و بایستی تغلیظ و رقیق سازی دارو ، قبل از تزریق انجام گیرد .

این دارو توسط پزشک معالج برای سرطان پستان ، اشکال خاص سرطان ریه ، سرطان تخمدان یا سرطان پروستات تجویز می گردد .

قبل از استفاده از تاکسوتر باید چه چیزهایی را در نظر گرفت؟

در موارد زیر نبایستی از این دارو استفاده گردد :

- سابقه واکنش های آلرژیک شدید به این دارو
- کاهش شدید تعداد گلبول های سفید خون
- وجود بیماری شدید کبدی
- بارداری و دوران شیردهی

	یا من اسمه دواء و ذكره شفاء	
---	-----------------------------------	---

آنچه باید در مورد تاکسوتر بدانید



واحد آموزش سلامت

تابستان ۹۹

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی قلب و عروق

شهید مدنی تبریز

<http://madanihosp.tbzmed.ac.ir>

اثرات احتمالی دارو در هنگام رانندگی و کارهای عملی

در صورت عدم احساس گیجی ، هیچ دلیل خاصی برای عدم انجام این اعمال وجود ندارد .

تاکسوتر چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

- دوز معمولی : دوز مورد استفاده به وزن و وضعیت عمومی بدن بستگی دارد ، پزشک بر اساس سطح بدن ، دوز مورد نیاز را محاسبه می کند .

- روش تجویز : تاکسوتر از طریق تزریق وریدی تجویز می گردد . تزریق دارو در بیمارستان صورت گرفته و تقریباً یک ساعت طول می کشد .

- دفعات تکرار تزریق دارو : معمولاً دارو هر سه هفته یک بار تزریق می گردد . ممکن است پزشک دوز و دفعات دریافت دارو را بر اساس نتایج آزمایشات خونی و وضعیت عمومی بدن پاسخ شما به دارو ، تغییر دهد . در صورت وجود هرگونه سوال ، آن را با پزشک و یا با پرستار در میان بگذارید .

عوارض جانبی

تاکسوتر همانند سایر داروهای ضد سرطان ، عوارض جانبی ناخواسته ای دارد . در مورد خطرات و فواید درمان ، از پزشک سوال کنید

ممکن است در طی تزریق دارو موارد زیر رخ دهد :

- واکنش های آلرژیک که بصورت بروز یک و یا چند تا از علائم زیر مشخص می شود :

(۴)

برافروختگی صورت، واکنش های پوستی ، خارش، احساس فشار در قفسه سینه ، دردپشت، ناراحتی تنفسی، تب یا لرز.

- در بین فواصل زمانی تزریق تاکسوتر ممکن است موارد زیر رخ دهند:

- کاهش در تعداد گلبول های قرمز یا سفیدخون (گلبول های سفید در مقابله با عفونت نقش خیلی مهمی دارند)، پلاکت ها و افزایش آنزیم های کبدی (بنابراین آزمایشات خونی بایستی بصورت منظم انجام گیرد).

- عفونت های راجعه شدید

- بروز تب، در صورت افزایش درجه حرارت بدن بلافاصله به پزشک مراجعه گردد.

- تورم مکرر دست ها و پاها و یا افزایش وزن بدن

- احساس بی حسی ، فرورفتن سوزن و یا درد در مفاصل یا عضلات،

- ناراحتی های شدید معده مانند تهوع و استفراغ ، زخم های دهانی و

بی اشتهایی

- بیبوست

- بر افروختگی صورت، واکنش های پوستی، خارش، احساس درد پشت ،

ناراحتی تنفسی

- ریزش مو که شایع است بعد از اتمام درمان ، موها مجدداً رشد خواهد

کرد .

- کاهش فشارخون و افزایش ضربان قلب

(۵)

تب یا اسهال بلافاصله به پزشک مراجعه کنید . در صورت بروز سایر نشانه های بیماری ، آنها را با پزشک مطرح نمایید .

نحوه نگهداری تاکسوتر

- تاریخ انقضاء: نباید بعد از تاریخ مصرف دارو مورد استفاده قرارگیرد .

- احتیاطات خاص نگهداری : دارو دور از دسترس

کودکان قرارگیرد و یال های تاکسوتر در دمای بین

۲،۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شده و از نور آفتاب

محافظت گردند . بایستی تاکسوتر مخلوط شده با

حلال ، بلافاصله بعد از آماده سازی مورد استفاده

قرارگیرد . درعین حال مطرح شده است که پایداری

فیزیکی و شیمیایی محلول در دمای اتاق و یا دمای

یخچال (۸-۲ درجه سانتیگراد) حفظ شود . محلول

آماده شده برای تزریق بایستی در دمای اتاق و در

عرض ۴ ساعت تزریق گردد .

(۶)